

# Μέθοδοι μονοδιάστατης ελαχιστοποίησης

Δ. Γ. Παπαγεωργίου  
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών  
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


dparageo@cc.uoi.gr  
<http://pc164.materials.uoi.gr/dparageo>

## Βασικές αρχές μεθόδων ελαχιστοποίησης

- Οι μέθοδοι ελαχιστοποίησης είναι επαναληπτικές.
- Ξεκινώντας από μια αρχική προσέγγιση του ελαχίστου (την συμβολίζουμε  $x^{(0)}$ ) παράγουν διαδοχικές προσεγγίσεις  $x^{(1)}, x^{(2)} \dots x^{(k)}$  που συγκλίνουν στο ελάχιστο.

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες μεθόδων:

- Μέθοδοι που δεν χρησιμοποιούν τις παραγώγους, αλλά μόνο τις τιμές της συνάρτησης.
- Μέθοδοι που χρησιμοποιούν τις παραγώγους (πρώτες ή/και δεύτερες) της συνάρτησης.




Υπολογιστικές Μέθοδοι Πολύπλοκων Συστημάτων

Μονοδιάστατη ελαχιστοποίηση 2

## Αναζήτηση με διαμέριση

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x)$  και ένα διάστημα  $[a, b]$  μέσα στο οποίο γνωρίζουμε ότι βρίσκεται το ελάχιστο.



Αναζήτηση με διαμέριση:

- Χωρίζουμε το διάστημα  $[a, b]$  σε  $M$  ίσα υποδιαστήματα το καθένα με μήκος


$$h = \frac{b - a}{M}$$

- Ονομάζουμε τα σημεία  $x_0, x_1, x_2, \dots, x_M$
- Το κάθε σημείο  $x_i$  δίνεται από:  $x_i = a + ih$
- Υπολογίζουμε την τιμή της συνάρτησης σε κάθε σημείο:  $f_i = f(x_i)$
- Επιλέγουμε ως ελάχιστο  $x^*$  το σημείο  $x_i$  που έχει την μικρότερη τιμή  $f_i$

## Αναζήτηση με διαμέριση

Σφάλμα στην εύρεση του ελαχίστου

- Η αναζήτηση με διαμέριση βρίσκει μια προσεγγιστική λύση.
- Τι πρέπει να κάνουμε για να βρούμε μια ακριβέστερη προσέγγιση του ελαχίστου;  
→ Πυκνότερη διαμέριση.
- Ποιο είναι το σφάλμα που κάνουμε χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο;



- Πόσες διαμερίσεις χρειάζονται για να βρούμε το ελάχιστο με προκαθορισμένο σφάλμα ;

$$M = \frac{b - a}{\sigma}$$

- Παράδειγμα:

Αν  $a = 0, b = 1, \sigma = 10^{-6}$

$$M = \frac{b - a}{\sigma} = \frac{1}{10^{-6}} = 10^6$$

- Ποιο είναι το μικρότερο δυνατό σφάλμα που μπορούμε να απαιτήσουμε ;
- Εξαρτάται από τη σχετική ακρίβεια του υπολογιστή.  
Απλή ακρίβεια  $\approx 10^{-7}$   
Διπλή ακρίβεια  $\approx 10^{-15}$

## Αναζήτηση με διαμέριση


### Υπολογιστικός χρόνος που απαιτείται

- Πως μετράμε τον υπολογιστικό χρόνο που απαιτεί η αναζήτηση με διαμέριση;
- Πως συγκρίνουμε δύο διαφορετικούς αλγόριθμους για να βρούμε τον πιο αποδοτικό ;
- Σε όλους τους αλγόριθμους ελαχιστοποίησης γίνονται δύο ειδών υπολογισμοί:
  - Υπολογισμοί της αντικειμενικής συνάρτησης.
  - Λειτουργίες που αφορούν καθαυτό τον αλγόριθμο (πχ. εύρεση της μικρότερης τιμής)
- Θεωρούμε ότι ο χρόνος που απαιτείται για λειτουργίες του αλγορίθμου είναι μικρός.
- Χρησιμοποιούμε το **πλήθος υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης** για να αποτιμήσουμε την αποδοτικότητα κάθε αλγορίθμου ελαχιστοποίησης.
- Για μια διαμέριση  $M$  διαστημάτων απαιτούνται  $M + 1$  υπολογισμοί της συνάρτησης  $f(x)$

## Αναζήτηση με διαμέριση

### Γενίκευση σε πολλές διαστάσεις

- Θεωρήστε μια συνάρτηση 2 μεταβλητών  $f(x, y)$
- Πρέπει να κατασκευάσουμε διαμέριση στον άξονα  $x$  και στον άξονα  $y$



- Συνολικά απαιτούνται  $(M + 1)^2$  υπολογισμοί της συνάρτησης.

### Παράδειγμα:

- Πόσος χρόνος απαιτείται για μια συνάρτηση 5 μεταβλητών με διαμέριση 1000 διαστημάτων σε κάθε μεταβλητή, όταν ένας υπολογισμός της συνάρτησης διαρκεί 0.01ms ;
- Οι υπολογισμοί της συνάρτησης που απαιτούνται είναι:  
 $(1000 + 1)^5 \approx 10^{15}$
- Ο συνολικός χρόνος είναι:  
 $10^{15} \cdot 0.01\text{ms} = 10^{10}\text{s} \approx 116 \text{ days}$

Η αναζήτηση με διαμέριση είναι απαγορευτική για πολλές διαστάσεις.

## Αναζήτηση με διαμέριση

### Πλεονεκτήματα


- Εύκολη υλοποίηση
- Χρησιμοποιεί μόνο τις τιμές της συνάρτησης

### Μειονεκτήματα

- Απαιτούνται πολλοί υπολογισμοί της συνάρτησης για μικρή έστω ακρίβεια
- Πρακτικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές διαστάσεις

## Διαστήματα αβεβαιότητας

Διάστημα αβεβαιότητας  
Ένα διάστημα  $[a, b]$  που φράζει τη θέση του ελαχίστου, δηλαδή  
 $a \leq x^* \leq b$



Το διάστημα  $[a, b]$  συνοδεύεται από ένα τρίτο σημείο  $c$  (σημείο ελέγχου), που βρίσκεται εντός του διαστήματος  $a < c < b$  και τέτοιο ώστε:

$$f(c) < f(a)$$

$$f(c) < f(b)$$

Γράφουμε:  $[a, b], c$

## Προσέγγιση του ελαχίστου σε διάστημα αβεβαιότητας

Αν το μήκος του διαστήματος  $b - a$  είναι μικρό, τότε μια καλή προσέγγιση του ελαχιστοποιητή  $x^*$  είναι:

$$x^* \approx \frac{b + a}{2}$$

με σφάλμα (το πολύ):

$$\sigma = \frac{b - a}{2}$$


αλλιώς

πρέπει να μικρύνουμε το διάστημα αβεβαιότητας μέχρι να πετύχουμε ικανοποιητικό σφάλμα.


## Μείωση του διαστήματος αβεβαιότητας

Χρησιμοποιώντας μόνο τιμές της συνάρτησης

- Θεωρούμε δύο νέα σημεία  $x_1, x_2$  εντός του διαστήματος  $[a, b]$  τέτοια ώστε  $a < x_1 < x_2 < b$
- Υπολογίζουμε τις τιμές της συνάρτησης  $f(x_1), f(x_2)$
- Συγκρίνουμε τις τιμές  $f(x_1), f(x_2)$  και απορρίπτουμε ένα τμήμα του διαστήματος.



Νέο διάστημα αβεβαιότητας:  $[a, x_2]$



Νέο διάστημα αβεβαιότητας:  $[x_1, b]$

## Μείωση του διαστήματος αβεβαιότητας

### Αλγόριθμος

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x)$  και διάστημα αβεβαιότητας  $[a, b]$

1. Θεωρούμε δύο νέα σημεία  $x_1, x_2$  εντός του διαστήματος  $[a, b]$  τέτοια ώστε  $a < x_1 < x_2 < b$
2. Υπολογίζουμε τις τιμές της συνάρτησης  $f(x_1), f(x_2)$
3. Έλεγχος
  - a. Αν  $f(x_1) < f(x_2)$  τότε θέτουμε ως νέο διάστημα το  $[a, x_2]$
  - b. Αν  $f(x_1) \geq f(x_2)$  τότε θέτουμε ως νέο διάστημα το  $[x_1, b]$
4. Επαναλαμβάνουμε από το βήμα 1

- Πότε τερματίζεται η διαδικασία ;
- Πως επιλέγουμε τα εσωτερικά σημεία ;
- Πως μετράμε την απόδοση του αλγορίθμου ;

## Κριτήριο τερματισμού

Η διαδικασία τερματίζεται όταν το σφάλμα γίνει μικρότερο από μια προκαθορισμένη τιμή  $\sigma$ , δηλαδή:

$$\text{σφάλμα} = \frac{b - a}{2} < \sigma \Rightarrow b - a < 2\sigma$$

Ο έλεγχος γίνεται πριν την έναρξη κάθε επανάληψης (πριν πάρουμε τα δύο νέα σημεία)

## Πως επιλέγουμε τα εσωτερικά σημεία

Ο τρόπος επιλογής των δύο εσωτερικών σημείων οδηγεί σε αλγορίθμους με διαφορετικές ιδιότητες:

- Αναζήτηση ίσων διαστημάτων
- Αναζήτηση διχοτόμησης
- Αναζήτηση Fibonacci
- Αναζήτηση χρυσής τομής

## Πως μετράμε την αποδοτικότητα


Για να αξιολογήσουμε τους διαφορετικούς τρόπους επιλογής των διαφορετικών σημείων ορίζουμε το συντελεστή μείωσης του διαστήματος αβεβαιότητας:

$$r(n) = \frac{\text{Μήκος τελικού διαστήματος μετά από } n \text{ κλήσεις της } f(x)}{\text{Μήκος αρχικού διαστήματος}}$$

## Αναζήτηση ίσων διαστημάτων

Διαλέγουμε τα εσωτερικά σημεία έτσι ώστε το διάστημα αβεβαιότητας να διαιρείται σε τρία ίσα τμήματα, δηλαδή:




$$x_1 = a + \frac{1}{3}(b - a) \quad x_2 = a + \frac{2}{3}(b - a)$$



## Αναζήτηση ίσων διαστημάτων

Επανάληψη

Αναπαράσταση του διαστήματος αβεβαιότητας



## Αναζήτηση ίσων διαστημάτων

Πως μικραίνει το διάστημα αβεβαιότητας

Επανάληψη      Μήκος διαστήματος      Πλήθος κλήσεων της  $f(x)$

0	$b - a$	
1	$\frac{2}{3}(b - a)$	2
2	$(\frac{2}{3})^2(b - a)$	4
3	$(\frac{2}{3})^3(b - a)$	6
⋮	⋮	⋮
$k$	$(\frac{2}{3})^k(b - a)$	$2k$

$$\text{σφάλμα} = \frac{\text{μήκος τελικού διαστήματος}}{2} = \frac{(\frac{2}{3})^k(b - a)}{2}$$

## Αναζήτηση ίσων διαστημάτων

Πόσες επαναλήψεις χρειαζόμαστε ;

$$\sigma = \frac{(\frac{2}{3})^k(b - a)}{2} \Rightarrow$$

$$\frac{2\sigma}{b - a} = (\frac{2}{3})^k \Rightarrow$$

$$\log \frac{2\sigma}{b - a} = \log (\frac{2}{3})^k \Rightarrow$$

$$\log \frac{2\sigma}{b - a} = k \log \frac{2}{3} \Rightarrow$$

$$k = \frac{\log \frac{2\sigma}{b - a}}{\log \frac{2}{3}}$$

Αν προκαθορίσουμε το μέγιστο αποδεκτό σφάλμα  $\sigma$  τότε το πλήθος των επαναλήψεων:

- Εξαρτάται μόνο από το μήκος του αρχικού διαστήματος αβεβαιότητας  $b - a$
- είναι ίδιο για οποιοδήποτε συνάρτηση  $f(x)$
- μπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων
- Πχ. Για μήκος αρχικού διαστήματος  $b - a = 1$  και  $\sigma = 10^{-6}$  παίρνουμε  $k = 33$

## Αναζήτηση ίσων διαστημάτων

Συντελεστής απόδοσης


$$r(n) = \frac{\text{Μήκος διαστήματος μετά από } n \text{ κλήσεις της } f(x)}{\text{Αρχικό μήκος διαστήματος}}$$

Επειδή κάθε επανάληψη χρειάζεται δύο υπολογισμούς της  $f(x)$ , μετά από  $n$  κλήσεις έχουν γίνει  $\frac{n}{2}$  επαναλήψεις. Μετά από  $\frac{n}{2}$  επαναλήψεις το μήκος του διαστήματος αβεβαιότητας είναι:

$$(\frac{2}{3})^{n/2}(b - a)$$

Συνεπώς ο συντελεστής απόδοσης είναι:


$$r(n) = \frac{(\frac{2}{3})^{n/2}(b - a)}{b - a} = (\frac{2}{3})^{n/2}$$



## Αναζήτηση διχοτόμησης

Διαλέγουμε τα εσωτερικά σημεία κοντά στο μέσο του διαστήματος αβεβαιότητας

$$x_1 = \frac{a + b}{2} - \frac{\varepsilon}{2} \quad x_2 = \frac{a + b}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$$




## Αναζήτηση διχοτόμησης


Επανάληψη

Αναπαράσταση του διαστήματος αβεβαιότητας


$$k = 0$$




$$k = 1$$



$$k = 2$$



$$k = 3$$



## Αναζήτηση διχοτόμησης

Πως μικραίνει το διάστημα αβεβαιότητας

Επανάληψη	Μήκος διαστήματος
0	$b - a$
1	$\frac{1}{2}(b - a) + \frac{\varepsilon}{2}$
2	$\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}(b - a) + \frac{\varepsilon}{2}\right] + \frac{\varepsilon}{2} = \frac{1}{4}(b - a) + \frac{\varepsilon}{2}\left(1 + \frac{1}{2}\right)$
3	$\frac{1}{2}\left[\frac{1}{4}(b - a) + \frac{\varepsilon}{2}\left(1 + \frac{1}{2}\right)\right] + \frac{\varepsilon}{2} = \frac{1}{8}(b - a) + \frac{\varepsilon}{2}\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)$
⋮	⋮
k	$\frac{1}{2^k}(b - a) + \frac{\varepsilon}{2}\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{k-1}}\right)$

## Αναζήτηση διχοτόμησης

Πως μικραίνει το διάστημα αβεβαιότητας

Μετά από  $k$  επαναλήψεις το μήκος του διαστήματος αβεβαιότητας είναι:

$$\frac{1}{2^k}(b - a) + \frac{\varepsilon}{2}\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{k-1}}\right)$$

Όμως ισχύει ότι (ταυτότητα):

$$1 - x^k = (1 - x)(1 + x + x^2 + \dots + x^{k-1}) \Rightarrow$$

$$(1 + x + x^2 + \dots + x^{k-1}) = \frac{1 - x^k}{1 - x}$$

Στην περίπτωση μας  $x = \frac{1}{2}$  Συνεπώς:

$$\frac{\varepsilon}{2}\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{k-1}}\right) = \frac{\varepsilon}{2} \frac{1 - \frac{1}{2^k}}{1 - \frac{1}{2}} = \varepsilon \left(1 - \frac{1}{2^k}\right)$$

## Αναζήτηση διχοτόμησης

Πως μικραίνει το διάστημα αβεβαιότητας

Τελικά το μήκος του διαστήματος μετά από  $k$  επαναλήψεις είναι:

$$\frac{1}{2^k}(b - a) + \varepsilon \left(1 - \frac{1}{2^k}\right)$$

Παρατηρήστε ότι όταν  $k \rightarrow \infty$  τότε το μήκος  $\rightarrow \varepsilon$

Συνεπώς το τελικό διάστημα αβεβαιότητας δεν μπορεί να γίνει μικρότερο από  $\varepsilon$

## Αναζήτηση διχοτόμησης

Πόσες επαναλήψεις χρειαζόμαστε ;

$$\sigmaφάλμα = \frac{\text{μήκος τελικού διαστήματος}}{2} = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2^k} (b - a) + \varepsilon \left( 1 - \frac{1}{2^k} \right) \right] = \sigma$$

- Δεν μπορούμε να λύσουμε αναλυτικά την ανωτέρω εξίσωση ως προς  $k$
- Μπορούμε όμως:
  - a. Να κάνουμε τον έλεγχο για το σφάλμα στην αρχή κάθε επανάληψης.
  - b. Να θεωρήσουμε ότι το  $\varepsilon$  είναι μικρό, οπότε γράφουμε:

$$\frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2^k} (b - a) \right] = \sigma \Rightarrow \frac{1}{2^k} = \frac{2\sigma}{b - a} \Rightarrow \log \frac{1}{2^k} = \log \frac{2\sigma}{b - a} \Rightarrow$$

$$k \log \frac{1}{2} = \log \frac{2\sigma}{b - a} \Rightarrow k = \frac{\log \frac{2\sigma}{b - a}}{\log \frac{1}{2}}$$

Πχ. Για μήκος αρχικού διαστήματος  $b - a = 1$  και  $\sigma = 10^{-6}$  βρίσκουμε  $k = 19$

## Αναζήτηση διχοτόμησης

Συντελεστής απόδοσης


$$r(n) = \frac{\text{Μήκος διαστήματος μετά από } n \text{ κλήσεις της } f(x)}{\text{Αρχικό μήκος διαστήματος}}$$

Επειδή κάθε επανάληψη χρειάζεται δύο υπολογισμούς της  $f(x)$ , μετά από  $n$  κλήσεις έχουν γίνει  $\frac{n}{2}$  επαναλήψεις. Μετά από  $\frac{n}{2}$  επαναλήψεις το μήκος του διαστήματος αβεβαιότητας είναι:

$$\approx \frac{1}{2^{n/2}} (b - a)$$

Συνεπώς ο συντελεστής απόδοσης είναι:


$$r(n) = \frac{1}{2^{n/2}} (b - a) = \left( \frac{1}{2} \right)^{n/2}$$



## Εύρεση αρχικού διαστήματος αβεβαιότητας

Εύρεση αρχικού διαστήματος αβεβαιότητας

1. Δίνεται μια τιμή εκκίνησης  $x_1$  και βήμα  $\delta$
2. Υπολογίζουμε την  $f(x_1)$ .
3. Παίρνουμε ένα δεύτερο σημείο  $x_2 = x_1 + \delta$  και υπολογίζουμε την  $f(x_2)$ .
4. Επαναλαμβάνουμε για  $k = 3, 4, \dots$ 
  - a. Διπλασιάζουμε το βήμα  $\delta \leftarrow 2\delta$
  - b. Παίρνουμε ένα νέο σημείο  $x_k = x_{k-1} + \delta$
  - c. Ελέγχουμε αν τα σημεία  $[x_{k-2}, x_k], x_{k-1}$  αποτελούν διάστημα αβεβαιότητας.



Τι γίνεται αν  $f(x_2) > f(x_1)$  ;

## Μείωση διαστήματος αβεβαιότητας: Τετραγωνική παρεμβολή

Η βασική ιδέα

Αφού ξέρουμε τις τιμές της συνάρτησης σε τρία σημεία  $a, b, c$  μπορούμε να προσεγγίσουμε τη συνάρτηση  $f(x)$  με μια παραβολή που διέρχεται από τα τρία αυτά σημεία.

Η παραβολή έχει εξίσωση:

$$p(x) = Ax^2 + Bx + C$$

όπου τα  $A, B, C$  πρέπει να προσδιοριστούν

Το ελάχιστο της παραβολής είναι:

$$\tilde{x} = -\frac{B}{2A}$$


Οι άγνωστοι συντελεστές προσδιορίζονται από:

$$f(a) = Aa^2 + Ba + C$$

$$f(b) = Ab^2 + Bb + C$$

$$f(c) = Ac^2 + Bc + C$$

Γραμμικό σύστημα τριών εξισώσεων με τρεις αγνώστους



## Μείωση του διαστήματος αβεβαιότητας: Τετραγωνική παρεμβολή

Λύνοντας το σύστημα λαμβάνουμε τους συντελεστές  $A, B, C$ .

Το ελάχιστο της παραβολής είναι:


$$\tilde{x} = \frac{1}{2} \frac{a^2(f_b - f_c) + b^2(f_c - f_a) + c^2(f_a - f_b)}{a(f_b - f_c) + b(f_c - f_a) + c(f_a - f_b)}$$

όπου συμβολίζουμε:

$$f_a = f(a) \quad f_b = f(b) \quad f_c = f(c)$$

Στη συνέχεια ανάλογα με τη θέση του ελαχίστου απορρίπτουμε ένα τμήμα του διαστήματος αβεβαιότητας.

## Μείωση του διαστήματος αβεβαιότητας: Τετραγωνική παρεμβολή



## Μείωση του διαστήματος αβεβαιότητας: Τετραγωνική παρεμβολή

### Αλγόριθμος

1. Δίνονται ως είσοδος το αρχικό διάστημα αβεβαιότητας  $[a, b], c$
2. Έλεγχος αν ικανοποιούνται τα κριτήρια τερματισμού
3. Υπολογίζουμε το ελάχιστο της παραβολής  $\tilde{x}$  και το  $\tilde{f} = f(\tilde{x})$
4. Έλεγχος της θέσης του  $\tilde{x}$  σε σχέση με το  $c$ 
  - a. Εάν  $\tilde{x} < c$ 
    - Εάν  $\tilde{f} < f(c)$  τότε το νέο διάστημα είναι:  $[a, c], \tilde{x}$
    - Εάν  $\tilde{f} \geq f(c)$  τότε το νέο διάστημα είναι:  $[\tilde{x}, b], c$
  - b. Εάν  $\tilde{x} \geq c$ 
    - Εάν  $\tilde{f} < f(c)$  τότε το νέο διάστημα είναι:  $[c, b], \tilde{x}$
    - Εάν  $\tilde{f} \geq f(c)$  τότε το νέο διάστημα είναι:  $[a, \tilde{x}], c$
5. Επαναλαμβάνουμε από το βήμα 2.

## Μείωση του διαστήματος αβεβαιότητας: Τετραγωνική παρεμβολή

### Κριτήρια τερματισμού

Εφαρμόζονται κατά περίπτωση ένα ή περισσότερα κριτήρια τερματισμού της διαδικασίας.

1. Αν το μέγεθος του διαστήματος αβεβαιότητας γίνει μικρότερο από ένα προκαθορισμένο όριο

$$b - a < 2\varepsilon_x$$

2. Η σχετική μείωση της τιμής της συνάρτησης είναι μικρότερη από ένα προκαθορισμένο όριο

$$\left| \frac{f_c^{(k)} - f_c^{(k+1)}}{f_c^{(k)}} \right| < \varepsilon_f$$

3. Ο συνολικός αριθμός κλήσεων της συνάρτησης ξεπερνά ένα προκαθορισμένο όριο  $n_{max}$



## Μείωση του διαστήματος αβεβαιότητας: Τετραγωνική παρεμβολή

Πόσες επαναλήψεις χρειάζονται ;


- Το πλήθος των επαναλήψεων που απαιτούνται για να πετύχουμε μια προκαθορισμένη ακρίβεια:
  - Εξαρτάται από τη μορφολογία της συνάρτησης
  - Δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων
- Σύγκριση με τις προηγούμενες μεθόδους μείωσης του διαστήματος αβεβαιότητας είναι εφικτή μόνο αφού ολοκληρωθεί ο αλγόριθμος.

## Μείωση του διαστήματος αβεβαιότητας: Κυβική παρεμβολή

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολυώνυμο υψηλότερης τάξης, πχ κυβικό

$$p(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$


## Μείωση του διαστήματος αβεβαιότητας: Χρήση της πρώτης παραγώγου



## Μείωση του διαστήματος αβεβαιότητας: Διχοτόμηση (με χρήση της πρώτης παραγώγου)


Αλγόριθμος

1. Χωρίζουμε το διάστημα σε δύο ίσα μέρη  $m = \frac{a+b}{2}$
2. Υπολογίζουμε την παράγωγο  $f'(m)$
3. Έλεγχος κριτηρίων τερματισμού
4. Έλεγχος
  - a. Εάν  $f'(a) < 0$  και  $f'(m) > 0$  το νέο διάστημα είναι  $[a, m]$
  - b. Εάν  $f'(m) < 0$  και  $f'(b) > 0$  το νέο διάστημα είναι  $[m, b]$
5. Επαναλαμβάνουμε από το βήμα 1



## Η μέθοδος Newton για εύρεση ριζών εξίσωσης

Θέλουμε να λύσουμε τη μη γραμμική εξίσωση  
 $\varphi(x) = 0$



Η βασική ιδέα:

Ξεκινάμε με μια αρχική προσέγγιση της λύσης  $x_0$

Κατόπιν ψάχνουμε ένα βήμα  $h$  τέτοιο ώστε το σημείο  $x_0 + h$  να είναι η λύση, δηλαδή:

$$\varphi(x_0 + h) = 0$$



Sir Isaac Newton 1642-1726

## Ανάπτυγμα σε σειρά Taylor

Ανάπτυγμα Taylor της συνάρτησης  $f(x)$  γύρω από το σημείο  $a$

$$f(x) = f(a) + (x-a)f'(a) + \frac{(x-a)^2}{2}f''(a) + \frac{(x-a)^3}{3!}f'''(a) + \dots + \frac{(x-a)^m}{m!}f^{(m)}(x)$$

ή αλλιώς

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(x)$$

Ανάπτυγμα της συνάρτησης  $f(x)$  σε απόσταση  $h$  από το σημείο  $x$

Προκύπτει αν θέσουμε στο παραπάνω όπου  $a$  το  $x$  και όπου  $x$  το  $x+h$

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \dots + \frac{h^m}{m!}f^{(m)}(x)$$

ή αλλιώς

$$f(x+h) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(x)$$

## Η μέθοδος Newton για εύρεση ριζών εξίσωσης

Γράφουμε τη σειρά Taylor της  $\varphi(x)$  κρατώντας μόνο τον όρο πρώτης τάξης

$$\varphi(x+h) = \varphi(x) + h\varphi'(x) + \frac{h^2}{2}\varphi''(x) + \dots + \frac{h^m}{m!}\varphi^{(m)}(x)$$

Θέλουμε ένα βήμα  $h$  τέτοιο ώστε να φτάσουμε στη λύση:

$$\varphi(x+h) = 0$$

Αντικαθιστούμε από τη σειρά Taylor:

$$\varphi(x) + h\varphi'(x) = 0 \Rightarrow$$

$$h = -\frac{\varphi(x)}{\varphi'(x)}$$

Βήμα Newton για επίλυση εξισώσεων

## Η μέθοδος Newton για εύρεση ριζών εξίσωσης

Αλγόριθμος:

1. Δίνεται η συνάρτηση  $\varphi(x)$  και αρχικό σημείο  $x_0$
2. Επαναλαμβάνουμε για  $k = 1, 2, \dots$ 
  - a. Ελέγχουμε τα κριτήρια τερματισμού
  - b. Υπολογίζουμε το βήμα Newton:  $h = -\varphi(x)/\varphi'(x)$
  - c. Βρίσκουμε το νέο σημείο:  $x_{k+1} = x_k + h$

Συνήθη κριτήρια τερματισμού:

- $|\varphi(x)| < \varepsilon$
- Το πλήθος των επαναλήψεων ξεπερνάει ένα προκαθορισμένο αριθμό  $n_{max}$

## Η μέθοδος Newton για ελαχιστοποίηση

Εάν θέλουμε να βρούμε ελάχιστο της συνάρτησης  $f(x)$  εφαρμόζουμε τη μέθοδο Newton για να λύσουμε τη μη γραμμική εξίσωση:

$$f'(x) = 0$$

Γράφουμε το ανάπτυγμα Taylor της  $f'(x)$  κρατώντας μόνο τον όρο πρώτης τάξης:

$$f'(x+h) = f'(x) + hf''(x)$$


Το βήμα  $h$  πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μας οδηγήει στη λύση:

$$f'(x+h) = 0 \Rightarrow$$

$$f'(x) + hf''(x) = 0 \Rightarrow$$

$$h = -\frac{f'(x)}{f''(x)}$$

Βήμα Newton για ελαχιστοποίηση



## Η μέθοδος Newton για ελαχιστοποίηση

### Αλγόριθμος:

1. Δίνεται η συνάρτηση  $f(x)$  και αρχικό σημείο  $x_0$
2. Επαναλαμβάνουμε για  $k = 1, 2, \dots$ 
  - a. Ελέγχουμε τα κριτήρια τερματισμού
  - b. Υπολογίζουμε το βήμα Newton:  $h = -f'(x)/f''(x)$
  - c. Βρίσκουμε το νέο σημείο:  $x_{k+1} = x_k + h$

### Συνήθη κριτήρια τερματισμού:

- $|f'(x)| < \varepsilon$
- Το πλήθος των επαναλήψεων ξεπερνάει ένα προκαθορισμένο αριθμό  $n_{max}$